
三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

草木圖會四卷


草類


附子

附子

烏頭天雄附子側子並出蜀土然四品都是一種所產其高三四尺以來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹謹按本經冬採爲附子春採爲烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲爲側子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄一年種之便有此五物味辛大熱有大毒治陰毒傷寒又冷風濕痹大風筋骨攣急

半夏



半夏

半夏生槐里川谷在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖一端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重上大下小皮黃肉白五月八月內采根以灰裛二月湯洗暴乾以圓白存久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又苗根絕類半夏而苗高一二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏味辛有毒主胃冷嘔噦方藥之最要也一名守田一名地文一名水玉一名示姑又


虎掌

虎掌

虎掌生漢中山谷及冤句河北州郡亦有之三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上尖下中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之冀州人菜園中種此亦呼為天南星味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩


大黃

大黃

大黃山谷皆有以蜀川錦紋者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻根如芋長一二尺傍生細根如牛旁小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹江淮出者曰土大黃二月花開細實

又蜀州出一種羊蹄大黃療疥瘙甚効初生苗葉如羊蹄累年長大其葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金蕎麥採根破之亦有錦紋日乾之亦呼為土大黃味苦大寒無毒解風熱踈積熱風壅消食化氣導血大解壅滯推陳致新并傳一切瘡癤毒


葶藶

葶藶

葶藶生藁城平澤及田野京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草薺葶藶之屬是也至夏則枯死故此時採之一名丁歷一名草蒿一名大室一名大適味辛苦大寒無毒利小腸通水氣虛腫



桔梗

桔梗

桔梗生嵩高山谷及冤句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長楕四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛爲異開中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之一名利如一名房圖一名白藥一名梗草味辛苦微溫有小毒治上焦有熱治馬喉痺妊娠中惡心腹疼痛鼻衂骨槽風牙齦痛

茛菪子

莨菪子

莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殻作罌子狀如小石榴房中至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川王美人懷子而不乳意飲以浪蘩一撮以酒飲旋乳且不乳豈熱藥所治耶一名横唐一名行唐味苦甘寒有毒燒熏牙蟲及洗陰汗


草蒿

草蒿

草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏髙四五尺秋後開細淡黄花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使葉勿使根勿使莖四者若同反者成疾得童子小便浸之良一名青蒿一名方潰味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目

旋復花

旋復花

旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黄色上黨田野人呼爲金錢花七八月採花暴乾一名戴椹一名金沸草一名盛椹味甘有小毒主脇脇氣下寒熱水腫治膀胱宿水開胃止嘔逆不下食

射干

射干


射干生南陽山谷田野今在處有之春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張如翅羽狀葉中抽莖似萱草而彊硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾用之一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑味苦有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉治疰氣消瘀血

藜　藋



藜蘆

藜蘆生泰山山谷陝西山南東西州郡皆有之二月生苗葉青似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮有花肉紅色根似馬腸長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在大水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用名葱白藜蘆根鬚甚少只是三十莖生高山者為佳均州土俗呼為鹿葱一名葱苒一名葱菼一名山葱味辛微寒有毒主上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲


蛇含

蛇含

蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳八月採根陰乾用一名蛇銜味苦微寒無毒治蛇蟲蜂虺所傷能治丹瘮小兒寒熱


蜀漆

蜀漆

蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青蕚五月結實圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似楸葉八月採根陰乾用味辛微溫有毒治久瘧主堅癥下積聚

甘遂



甘遂

甘遂生中山川谷陜西江東亦有之或云京西出者最佳苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之隂乾以實重者爲勝又有一種草甘遂苗一莖端六月葉如萞麻鬼臼葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注云草甘遂即蚤體也一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名生田味苦甘大寒有毒能瀉十二種水疾治心腹堅滿

白歛



白斂

白斂生衡山山谷江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枝同窠皮黑肉白二月八月採根切片暴乾用一名兎核一名白草一名白根一名崑崙味苦微寒有毒治丁瘡發背湯火灼爛


青葙

青葙子

青葙子生平谷道傍江淮州郡近道亦有之二月内生青苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六月七月内生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黄名陶珠衍苗亦相似恐不堪用之一名草蒿一名萋蒿味苦微寒無毒治五臟邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺



白及

白及生北山川谷又冤句及越山江淮河陜漢黔諸州皆
有之生石山上春生苗長一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生
一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃黑色至
冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七月採根
一名甘根一名連及草味辛微寒無毒能治結熱不消主
陰下痿治面上皯炮


大戟

大戟

大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺以來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花其根又似蕪荑根似細苜蓿皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南者葉似芍藥一名邛鉅味苦甘大寒有小毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水能墮胎孕


茵芋

茵芋

茵芋出太山川谷淮州絳州萊州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細花白色五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾亦可一名莞草一名卑共味苦微温有毒治五臟寒熱似瘧諸關節中風痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風


貫衆

貫衆

貫衆生玄山山谷及寃句少室山陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老雞三月採根晒乾荆南人取根爲末水調服一錢匕止鼻衄尤效一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻一名伯萍一名藥藻味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒除頭風止金瘡殺寸白蟲

牙子



牙子

牙子即狼牙子生淮南川谷及寃句江東京東州郡多有之苗似蛇苺而厚大深緑色根黑若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲

羊躑躅



羊躑躅

羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋葍輩而正黃色羊食其葉則躑躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦𢙣然或云此種不入藥一名玉支味辛温有大毒


首烏

何首烏

何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌本名交藤因何首烏服而得名一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣久服長筋骨益精髓

商陸

商陸

商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾一名葛根一名夜呼味苦辛有毒能瀉十種水病喉痺不通


威靈仙

威霊仙

威霊仙出商州上洛山及華山并平澤陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖便如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月内採花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年盡朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊巳日採以不聞水聲者佳一名能消味苦溫無毒治腰腎脚膝積聚腸内諸冷病積年不差者服之無不立効

牽牛子




牽牛子

牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬墻高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山芋即此也味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便


蓖麻子

蓖麻子

蓖麻子在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黄斑褐形如牛蜱故名之夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大味甘辛有小毒主水癥又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之


天南星

天南星

天南星生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻相類即虎掌也小者名由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無班根如雞卵又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾味苦辛有毒主中風除痰痳痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎



羊蹄禿

羊蹄禿

羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實令人生採根醋摩塗疥癬速效一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲

菰根



菰根

菰根今江湖陂澤中皆有之即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手臺中有墨者謂之茭欝其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰葑其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以爲美饌大寒主腸胃痼熱消渴止小便利


萹蓄

萹蓄

萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中有地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾能殺虫衛詩綠竹猗猗說者曰綠萹竹也竹萹竹也即謂此萹蓄也味苦無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕

狼毒



狼毒

狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黄莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黄肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良一名續毒味辛有大毒治欬欬癥瘕亦殺鼠殺飛鳥走獸

荈 茶



豨薟

豨薟俗呼火枚處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麄莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾用味苦寒有小毒主熱𧏾煩滿不能食兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用


馬鞭草

馬鞭草

馬鞭草衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高二三尺抽三四穗七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用主下部濕瘡

苧根



苧根

苧閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉而青背白有短毛夏秋閒着細穗青花其根黄白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生荆楊閒歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閒尚復如此其根味寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴


白頭翁



白頭翁

白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓青二月三月開紫花黃葉五月六月結實其葉有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用味苦溫有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘰癧一切風氣及煖腰膝明目

蘆



蘆

蘆　在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節踈二月八月採日乾用之當取小底甘辛者其露出浮水中者並不堪用按爾雅謂蘆根爲葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者似萑而細長高數尺江東人呼爲蒹藡與荻同者爲菼爲亂似葦而小中實江東呼爲烏蓲或謂之荻至秋堅成即謂之萑其華皆名芀其萌笋皆名虇味甘寒三消渴客熱止小便利

鬼臼




鬼臼

鬼臼生九真山谷及寃句江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之多生深山岩石之陰葉似蓖麻重樓初生一莖莖端一葉亦有兩岐老者年長一莖莖枯為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色二月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根暴乾用一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名觧毒味辛微温有毒能主尸疰殗殜勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼


馬兜鈴

馬兜鈴

馬兜鈴生關中今河東北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾用味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡


仙茅

仙茅

仙茅生西域及大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似棕櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麄褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子一名獨茅根一名茅爪子一名婆羅門味辛温有毒治一切風氣補勞傷開胃下氣益房事